

2,4 cm lata, subacuminata, basi cuneata, utrimque glabrescens, costa tamen sparse pubescente, nervis utroque latere costae 7—9; stipulae breviter aristatae, extus pubescentes, axilla sericeo-villosae. Rami floriferi uno internodio cortice brunneo vestito formati. Inflorescentia subsessilis, axe duobus jugis foliorum et ramulis inferioribus interdum uno jugo foliorum munita, glabrescens. Calyx dentibus patentibus, ciliatis, 0,5 mm longis. Corolla tubo 8 mm longo, intus piloso, lobis 6 mm longis. Stylus 18 mm longus.

Distr. Burma. — Burma, Irawaddi, Mejanoung (Gamble 115 K. typus).

143. *Pavetta fruticosa* Craib in Kew Bull. 1932 p. 431.

Frutex circ. 1 m altus. Rami veteriores cortice laevi, brunneo vestiti. Folia petiolata; petiolus circ. 0,5 cm longus; lamina subcoriacea, obovata, 5—6,5 cm longa, 2,5—3 cm lata, obtusa an subacuta, basi cuneata, supra scabra, subtus glabrescens, nervis utroque latere costae circ. 9; stipulae longiusculae cuspidatae, axilla dense sericeo-villosae, diu persistentes. Rami floriferi uno an duobus internodiis longis, cortice brunneo vestitis compositi. Inflorescentia breviter pedunculata, axe duobus jugis foliorum munita, sparse pubescens an glabrescens. Calyx dentibus 0,5 mm longis. Corolla tubo 12 mm longo, intus densius piloso, lobis 5,5 mm longis. Stylus 30 mm longus.

Distr. Siam. — Siam, Chiengmai, Doi Svotop (Kerr 1149 K. typus).

144. *Pavetta Chevalieri* Brem. sp. nov.; *P. indica* L. var. *canescens* Pitard in Lecomte, Fl. Gén. de l'Indo-Chine III (1924) p. 332 p. p.

Frutex. Rami novelli griseo-tomentosi, postea cortice brunneo vestiti. Folia petiolata; petiolus 0,4—0,8 cm longus, tomentosus; lamina elliptica, circ. 8 cm longa et 3,2 cm lata, obtusa, basi acuta an contracta, supra sparse sed molliter pubescens, subtus tomentosa, nervis utroque latere costae 6—8; stipulae breviter aristatae, axilla sericeo-villosae. Rami floriferi uno an duobus internodiis compositi. Inflorescentia breviter pedunculata, axe uno an duobus jugis foliorum munita, ramulis pubescentibus, pedicellis tomentosis. Ovarium tomentosum. Calyx pubescens, lobis circ. 1 mm longis. Corollam maturam non vidi; tubus intus pilosus.

Distr. Annam. — Annam, Langbian Mts, Dran (Chevalier 40597 Par. typus, Hayaka s. n. Par.).

145. *Pavetta birmahica* Brem. sp. nov.

Frutex. Rami novelli puberuli, mox glabrescentes. Folia petiolata; petiolus 1—1,5 cm longus, pubescens; lamina elliptica, 4—8 cm longa, 2,5—4,8 cm lata, breviter acuminata, basi acuta, subtus semper tomentosa, nervis utroque latere costae 8—10; stipulae cuspidatae, extus puberulae, axilla sericeo-villosae. Rami floriferi plus minusve rectangulariter patentes, 1—3 internodiis compositi, internodio inferiore semper multo longiore, cortice gri-